

Харківська обласна рада  
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна  
Державне управління охорони навколишнього природного середовища  
у Харківській області

**ЧЕРВОНА КНИГА  
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
Тваринний світ**

Харків — 2013

**ОРЕЛ-КАРЛИК***Hieraetus pennatus* (J. F. Gmelin, 1788)**Орёл-карлик**

Клас Птахи — Aves

Ряд Яструбоподібні — Accipitriformes

Родина Яструбові — Accipitridae

**Природоохоронний статус**

Рідкісний стенотопний вид. Занесений до Червоної книги України (рідкісний), списків Бернської конвенції (Додаток II), Боннської конвенції (Додатки I і II) та конвенції СІТЕС (Додаток II).

**Морфологічна характеристика**

Маса тіла 0,7–1 кг, довжина тіла 45–50 см, розмах крил 1,1–1,32 м. Дві форми забарвлення: бура з невеликими яскраво-білими плямами на плечах та світла з білуватим черевом, спідніми покривними перами крил і загальним темним верхом.

**Ареал виду та його поширення у регіоні**

Південна частина та помірний пояс Євразії. В Україні гніздиться головним чином у лісостеповій смузі, спорадично у лісовій та степовій (по долинах річок, байрачних і штучних лісах) смугах, а також у передгір'ях Карпат. У Харківській області гніздиться по всій території, але здебільшого у центральних районах, на півдні та сході — у заплавних та байрачних дібровах.

**Чисельність**

У середині ХХ століття помітно зменшилась, наприкінці 1980–1990 років становила не менше 450–500 пар. В останнє десятиріччя спостерігається стабілізація чисельності. Більшість птахів гніздиться на півдні Одеської області, в Кіровоградській області та на сході



України. В Європі гніздиться 4,4–8,9 тис. пар. У Харківській області можливе гніздування не менше 70–80 пар.

**Місця перебування**

Старовікові широколистяні та мішані ліси поблизу відкритих просторів; на Харківщині — здебільшого у байрачних та заплавних лісах степової зони.

**Особливості біології**

Гніздовий перелітний птах. Весняний проліт — у квітні. З другої половини квітня займає гніздові ділянки. Гнізда розташовані у верхній частині старих дерев, на висоті 10–27 м. У кладці 1–2 (рідше 3) яйця. Пташенята залишають гніздо у липні — на початку серпня. Живиться переважно гризунами і птахами дрібних та середніх розмірів. Полює в лісі та на прилеглих полях і луках; часто залітає далеко в степ. Мисливська ділянка може бути на відстані 5–6 км від гнізда.

**Основні чинники зниження чисельності**

Скорочення площі старих лісів, незаконний відстріл, зменшення чисельності ховрахів як головного об'єкта живлення, загибель птахів на високівольтних лініях, отруєння (ненавмисне отруєння як наслідок застосування отруєних принад для мишоподібних гризунів).

**Заходи охорони**

Влаштування запобіжних пристроїв на вежах ліній електромереж, що не дозволяють орлам використовувати їх у якості присад. Посилення контролю за полюванням; неприпустимість добування птахів мисливцями. Проведення моніторингу стану популяції виду, зокрема — на найважливіших для виду територіях.

**Джерела інформації**

Menzbier, 1884; Сомов, 1897; Грамма та ін., 1992; Ветров, 1993; Атемасова, Атемасов, 2006; Витер, 2007; Ветров, Мілобог, 2009; Банік М. В., Надточій Г. С. (2012, усні повідомлення).

Автор: В. В. Ветров

Фото: © А. Кузьмін

[http://www.rbcu.ru/birdclass/list.php?id=0&SECTION\\_ID=1027](http://www.rbcu.ru/birdclass/list.php?id=0&SECTION_ID=1027)