

Харківська обласна рада
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Державне управління охорони навколишнього природного середовища
у Харківській області

**ЧЕРВОНА КНИГА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Тваринний світ**

Харків — 2013

СИНЯВЕЦЬ ВІКРАМА*Pseudophilotes vicrama* (Moore, 1865)**Голубянка Викрама**

Клас Комахи — Insecta
Ряд Лускокрилі — Lepidoptera
Родина Синявці — Lycaenidae

**Природоохоронний статус**

Вразливий. Занесений до Європейського червоного списку (NT).

Морфологічна характеристика

Метелик із розмахом крил 19–26 мм. Крила самців зверху блакитно-фіолетові, а самиць — фіолетово-бурі. Бахромка строката. На передніх крилах добре помітна дискальна крапка.

Ареал виду та його поширення у регіоні

Центральна та Східна Європа (крім північних теренів), Західна та Центральна Азія. В Харківській області знайдено три популяції: дві на крейдяних відшаруваннях у заплавах річок Вовча та Оскіл та на степовій ділянці біля с. Черноглазівка Золочівського району. В області мешкає підвид *P. vicrama schiffermulleri* (Hemming, 1929).

Чисельність

Чисельність загалом невисока; в сприятливі роки звичайний вид у межах локальних популяцій.

Місця перебування

Зустрічається дуже локально на ділянках цілинних степів та крейдяних відшарувань на схилах річкових терас.

Особливості біології

Впродовж року розвивається дві генерації. Літ метеликів спосте-

рігається з середини травня до серпня. Кормові рослини гусені — чебреці (*Thymus* spp.). Гусені — факультативні міркеофіли.

Основні чинники зниження чисельності

Руйнування природних степових біотопів через надмірний випас худоби та лісові насадження.

Заходи охорони

Охороняється у національному природному парку «Дворічанський». Необхідна організація ентомологічних резерватів в місцях існування виду з категоричною заборобою створення лісових насаджень та надмірного випасу худоби.

**Джерела інформації**

Tolman, 2001; Некрутенко, Чиколовець, 2005; Каролінський Є. (2006–2012, особисті повідомлення).

Автор: Ю. О. Гуля
Фото: © Є. О. Каролінський