

Харківська обласна рада  
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна  
Державне управління охорони навколишнього природного середовища  
у Харківській області

**ЧЕРВОНА КНИГА  
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
Тваринний світ**

Харків — 2013

**ЗЛАТКА КОРЕНЕВА МІДНА***Sphenoptera cuprina* Motschulsky, 1860**Златка корневая медная**

Клас Комахи — Insecta  
Ряд Жуки — Coleoptera  
Родина Златки — Vuprestidae

**Природоохоронний статус**

Рідкісний, реліктовий, стенотопний вид.

**Морфологічна характеристика**

Довжина тіла 8–14 мм. Зверху бронзовий, з пурпуровим, мідним або зеленуватим блиском, знизу чорно-синій, фіолетовий або бронзово-чорний. Дрібна пунктировка передньоспинки ніжна, але добре помітна. Надкрила з поздовжніми рядами крапок або коротких рисок, не зливаються один з одним.

**Ареал виду та його поширення у регіоні**

Азербайджан, Вірменія, Болгарія, Греція, Італія, центральна та південноєвропейська частина Росії. В Україні відомий зі степової, лісостепової частини та Криму. У Харківській області трапляється у Вовчанському та Дворічанському районах.

**Чисельність**

Вид дуже локальний, трапляється зрідка, відомий за декількома екземплярами.

**Місця перебування**

Нижньоголоценовий ксеротермічний степовий релікт, що трапляється на ксерофітних луках та у степах. Цілині степові та крейдяні ділянки, добре освітлені, з розрідженим трав'яним покривом.

**Особливості біології**

Імаго активні з травня до середини червня. У кінці травня було відмічено парування на камінцях крейди. Розвивається у корінні молодих саджанців жовтої акації *Caragana arborescens* та еспарцету *Onobrychis* sp. Личинки прогризають у деревині один-два кільцевих ходів, потім спускаються у коріння. Зимують личинки різного віку. Після зимівлі личинки піднімаються вгору по корінню та заляльковуються у нижній частині стовбурця. Генерація однорічна, в деяких випадках — дво-, трирічна.

**Основні чинники зниження чисельності**

Зміни умов існування внаслідок розорювання цілих ділянок степу; руйнування крейдяних відслонень.

**Заходи охорони**

Заборона розорювання та заліснення решток цілих степів; створення природних резерватів. Збереження цілісності крейдяних відслонень: створення природних резерватів, заборона заліснення, заборона випасу та прогону худоби та інших дій, що руйнують поверхню крейдяних схилів.

**Джерела інформації**

Рихтер, Алексеев, 1965; Гурьева, 1974; Catalogue..., 2003; При-сний, 2003; Прохоров, 2010; Скрильник, Терехова, 2011.

Автор: Ю. Є. Скрильник  
Фото: © Ю. Є. Скрильник