

Харківська обласна рада  
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна  
Державне управління охорони навколишнього природного середовища  
у Харківській області

**ЧЕРВОНА КНИГА  
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
Тваринний світ**

Харків — 2013

**БІЛОЧЕРЕВА БІЛОЗУБКА***Crocidura leucodon* (Hermann, 1780)**Белобрюхая землеройка**

Клас Ссавці — Mammalia  
Ряд Комахоїдні — Insectivora  
Родина Мідицеві — Sorsciidae

**Природоохоронний статус**

Рідкісний. Занесений до Червоної книги України (недостатньо відомий) та списку Бернської конвенції (Додаток III).

**Морфологічна характеристика**

Довжина тіла 5,5–7,3 см, довжина хвоста 2,7–4 см. Забарвлення верху буре, спід чисто-білий, різко відмежований від боків. Хвіст знизу світліший, ніж зверху. Хвіст покритий рівним хутром, з якого виступають окремі подовжені волоски. Зуби білі, вуха помітно виступають із хутра. Забарвлення досить мінливе.

**Ареал виду та його поширення в регіоні**

Область поширення виду охоплює Центральну і Південно-Східну Європу, а також південно-західну Азію. У Харківській області згадується з середини XIX століття. У червні 1968 року була спіймана вагітна самиця біля с. Кам'янка у Дворічанському районі. Нами відмічена лише у пелетках сов — 2 черепи у Борівському районі на лівому березі Червонооскільського водосховища.

**Чисельність**

Відомі окремі знахідки у степовій частині області.

**Місця перебування**

Білочерева білозубка населяє вільні від лісу простори — парові поля, занедбані пасовища, узбіччя доріг і сади. В певні сезони

тварини переходять на територію більш багату на їжу. Вид тісно прив'язаний до людських поселень, особливо в зимовий час.

**Особливості біології**

Живиться комахами та їх личинками, ловить також сінокошців, павуків, равликів. Розмноження відбувається, ймовірно, з квітня по вересень. Народжує від 3 до 10 дитинчат вагою один грам. Очі відкривають у віці 7–13 днів; через 40 днів стають самостійними. Молоді утворюють типові для багатьох білозубок «каравани». Дитинчата хапаються зубами за основу хвоста дорослої тварини, що йде попереду.

**Основні чинники зниження чисельності**

Трансформація біотопів у межах ареалу.

**Заходи охорони**

Надання природоохоронного статусу територіям, де знайдений вид; запобігання руйнуванню та трансформації біотопів.

**Джерела інформації**

Чернай, 1853; Сомов, 1897; Силантьєв, 1898; Аверин, 1915; Мигулин, 1927; Stresemann, 1995; Mitchell-Jones, 1999; Наглов В. А. (1982, особисте повідомлення).

Автори: В. А. Токарський, О. В. Зоря

Фото: © Tamas Cserkés

[http://www.carpathianbasinspecies.eu/12\\_](http://www.carpathianbasinspecies.eu/12_)

Mammals%28Mammalia%29/Cserkesz\_Tamas\_Mammalia\_1/Crocidura%20leucodon67\_01\_logo.jpg